

# エンクロン レメディーナ 第2類医薬品 50mL

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 〔成分・分量〕(1g中)

ジフェンヒドラミン10mg／リドカイン20mg／グリチルリチン酸二カリウム10mg／トコフェロール酢酸エステル5mg／イソプロピルメチルフェノール1mg／ℓ-メントール5mg 添加物として、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セチル硫酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、エタノール、パラベン、その他2成分を含有します。

### 〔適応症〕

かゆみ、皮膚炎、かぶれ、湿疹、じんましん、あせも、ただれ、しもやけ、虫さされ

### 〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- 高温および極端な低温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 火気に近づけないでください。
- 本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリ類、時計、寝具、プラスチック製品、化繊製品、皮革製品、床、家具などにつかないように注意してください。(変質する場合があります。)
- 使用期限(箱底面に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- 液もれを防ぐためキャップをしっかりと閉めてください。
- 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- 使用後はボトルの口元を拭いてください。

**火気厳禁** 第二石油類(エタノール) 水溶性 危険等級Ⅲ

発売元 資生堂薬品株式会社 東京都中央区銀座7-5-5

お客さま窓口 03-3573-6673

受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 資生堂 東京都中央区銀座7-5-5

MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度  
0120-149-931

